

AGE	DOULEUR AIGUE		DOULEUR PROLONGEE	
	Echelle	seuil de traitement	Echelle	seuil de traitement
	Hétéro-évaluation		Hétéro-évaluation	
<i>Prématuré Et nouveau-né</i>	DAN (Douleur Aiguë du Nouveau-né à terme et prématuré), NFCS (Néonatal Facial Coding System à 4 items), PIPP (Premature Infant Pain Profile)	3/10 1/4 score mini 0 à 6	EDIN (Echelle Douleur et Inconfort du Nouveau-né et prématuré)	5/15
<i>0 à 2 ans</i>	AMIEL-TISON OPS (Objective Pain Scale – à partir de 2 mois),	5/20 3/10	EDIN (Echelle Douleur et Inconfort du Nouveau-né et prématuré)	Outil validé pour le nouveau-né mais utilisable par défaut dans cette tranche d'âge
<i>2 à 7 ans</i>	OPS (Objective Pain Scale), CHEOPS (Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale – à partir de 1 an),	3/10 (ou 2/8 si 1 item absent) 9/13	DEGR (Douleur Enfant Gustave Roussy) HEDEN (hétéro évaluation douleur enfant)	10/40 3/10
<i>4 à 6 ans</i>	Echelle des visages	4/10	Echelle des visages	4/10
<i>En réanimation de la naissance à l'adolescence</i>	Echelle Comfort Scale	Score normal entre 8 et 19		
<i>Enfant Handicapé</i>	DESS (Douleur Enfant Sans Salvador)	A partir de 6 : douleur certaine	DESS (Douleur Enfant Sans Salvador)	A partir de 6 : douleur certaine
	Auto évaluation		Auto évaluation	
<i>A partir de 6 ans</i>	EVA (Echelle VisuelleAnalogique), ENS (Echelle Numérique Simple), Echelle des visages Les jetons	3/10 3/10 4/10	EVA (Echelle Visuelle Analogique), ENS (Echelle Numérique Simple), Echelle des visages Schéma du bonhomme DEGR (Douleur Enfant Gustave Roussy)	3/10 3/10 4/10 validée jusqu'à 6 ans mais utilisable au delà en cas d'atonie psychomotrice

