

Prévenir la douleur des soins chez le nourrisson : une obligation

article L110.5 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé



Allaitement
maternel



OU

Allaitement maternel ...

... puis piqûre et prélèvement veineux pendant la tétée.

*Pour une analgésie optimale :
2 minutes avant le soin*

et pendant toute la durée du geste ...

Le soin est terminé.

... associée à la succion.

Administration de solution sucrée ...

Piqûre et prélèvement veineux.

Solution
sucrée
et succion

2 ml de saccharose à 24 ou 30% ou de G30%,
pour le NN à terme de plus de 2.5 kg



Recommandations de bonne pratique : AFSSAPS 2009 (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé)
Réalisation sur une idée originale de Stéphanie THURILLET et Marie-Laure de MOUSTIER, Infirmières Etudiantes Puéricultrices (octobre 2006),
Institut de Puériculture et de Périnatalogie (Paris), affiche lauréate du 1er concours PEDIADOL affiches douleur de la 13^{ème} journée UNESCO
« La douleur de l'enfant. Quelles réponses ? » du 8 décembre 2006.
Détails et protocoles sur les sites : www.cnrdr.fr - www.pediadol.org - www.afssaps.fr

